

# Über die zu Stickoxydul führende katalytische Ammoniak-Oxydation an oxydischen Kontakten

INAUGURAL - DISSERTATION

zur Erlangung des Doktorgrades

genehmigt von der

Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät  
der Friedrich - Wilhelms - Universität zu Berlin

von

ADALBERT NEUHAUS

aus Görlitz

Tag der mündlichen Prüfung : 13. Dezember 1939







Tag der Promotion : 16. September 1940

Berichterstatter: Dozent Dr. Krauss  
Prof. Dr. Bodenstein



## Einleitung

Durch eine Reihe von Untersuchungen von M. B o d e n s t e i n und Mitarbeitern <sup>1)</sup> ist der Mechanismus der Ammoniakoxydation an Platin bei kleinen Drucken mit Hydroxylamin als erstem Zwischenprodukt im wesentlichen wie folgt formuliert worden:



Von W. K r a u s s u. H. S c h u l e i t <sup>2)</sup> ist jetzt gezeigt worden, daß am Platin bei kleinen Drucken und hohen Temperaturen alle Reaktionen am Kontakt verlaufen. Somit liegt kein Grund vor, anzunehmen, daß bei höheren Drucken irgendwelche von diesen Reaktionen mit Ausnahme des  $\text{HNO}_2$ -Zerfalls zu Stickoxyden in der Gasphase verlaufen, da die Stoßzahlen während der Verweilzeit der Produkte am Kontakt gesteigert sind. Am Platin bei kleinen Drucken und hohen Temperaturen fallen wegen der geringen O-Atom-Konzentration die Reaktionen 2, 5 und 6 aus. Dieses Schema sieht in dem  $\text{HNO}$  nicht mehr ein Zwischenprodukt zu  $\text{NO}$ , wie es früher von B o d e n s t e i n <sup>3)</sup> und heute noch von A n d r u s s o w <sup>4)</sup> und A. v. N a g e l <sup>5)</sup> vertreten wird, sondern lediglich einen Weg zu  $\text{N}_2\text{O}$  bzw.  $\text{N}_2$  und im  $\text{NH}_3\text{O}$  die Stufe zu  $\text{NO}$ . Hierdurch ist bis zu einem gewissen Grade Übereinstimmung mit K. A. H o f m a n n <sup>6)</sup> und C. K r ö g e r <sup>7)</sup> hergestellt, die an oxydischen Kontakten  $\text{NH}$  als Zwischenprodukt annehmen, wenn wir dieses  $\text{NH}$  durch  $\text{NH}_2\text{OH}$  ersetzen. Ein Versuch, an Oxydkontakten bei kleinen Drucken  $\text{NH}_3\text{O}$  nachzuweisen, scheiterte, da diese Oxyde sich bei den kleinen Drucken zersetzten. Wir haben daher bei gewöhnlichen Drucken gearbeitet und versucht, die Bildungsbedingungen für  $\text{N}_2\text{O}$  und  $\text{NO}$ , also die Reaktion 2, 3 und 4, zu ermitteln,

1) M. Bodenstein, Helv.chim.Acta 18 (1935) 758.

Z. Elektroch. 47 (1935) 466.

M. Bodenstein u. G. Büttner, Trab. IX. Congr.ind.Chim.

pura appl. 3 (1934) 475.

W. Krauss, Z. phys. Ch. (B) 39 (1938) 83.

2) W. Krauss u. H. Schuleit, Z.phys.Ch. (B) im Druck.

3) M. Bodenstein, Z.ang.Ch. 40 (1927) 177.

4) L. Andrussov, Z.ang.Ch. 39 (1926) 166, 40 (1927) 166,  
41 (1928) 205.

5) A. v. Nagel, Z. Elektroch. 36 (1930) 754.

6) K. A. Hofmann, L. Leschewski, W. Lemme, H. Galotti,  
K. Mayen, W. Gundelach, Ber. 60 (1927) 1190.

7) C. Kröger, Z.anorg.Ch. 205 (1932) 396, 206 (1932) 289

wobei der Hauptwert auf die Bildung von  $N_2O$  gelegt wurde, da die zu diesem führende Oxydation des Ammoniaks an oxydischen Kontakten kaum untersucht ist. Es ist nur die Oxydation an  $MnO_2$  bzw.  $MnO_2$ -haltigen Kontakten aus einer Arbeit von A. v. Nagel<sup>1)</sup> bekannt. Er gibt allerdings an<sup>2)</sup>, daß nach seinen Untersuchungen "an den verschiedensten Katalysatoren, darunter auch Platin, die Reaktion so geleitet werden kann, daß als Hauptprodukt  $N_2O$  auftritt". Eine Angabe, welche Oxyde er untersuchte, sowie welche Ergebnisse er erzielte, wurde nicht gemacht. Er hat nur Versuche an  $MnO_2$  veröffentlicht. Da uns also bis auf den einen Satz in der Veröffentlichung von A. v. Nagel nähere Kenntnisse über die zu  $N_2O$  führende Oxydation fehlen, sollte mit den vorliegenden Versuchen zunächst eine Reihe von Oxyden auf ihre Fähigkeit,  $N_2O$  zu bilden, untersucht werden.

An allgemeinen Versuchen über einen Zusammenhang zwischen Zustand und Eigenschaft des Oxydkatalysators und den verschiedenen Möglichkeiten der Ammoniakoxydation sind die Arbeiten von C. Kröger<sup>3)</sup> und R. Schenck<sup>4)</sup> zu nennen. Beide gehen von der gleichen Tatsache aus, daß die Aktivität des Oxydes (die Lockerung des Sauerstoffs) zusammenhängen muß mit dem Dissoziationsdruck des betreffenden Oxydes. C. Kröger stützt sich, soweit es die Ammoniakoxydation betrifft, im wesentlichen auf die Untersuchungen von B. Neumann und H. Rose<sup>5)</sup>. Diese Untersuchungen behandeln im allgemeinen nur den Fall der  $NO$ - bzw.  $N_2$ -Bildung und gehen nicht auf das Gebiet der  $N_2O$ -Bildung ein.

Da aber für die Ermittlung der Bildungsbedingungen der salpetrigen Säure am Kontakt - entweder über  $HNO$  oder  $NH_3O$  - gerade die  $N_2O$ -Bildung wesentlich ist, schien es wünschenswert, diese in Zusammenhang mit den Katalysatoreigenschaften zu bringen. Es sei vorweggenommen, daß sich die von M. Bodenstein u. Mitarb. gemachte Annahme, daß  $HNO_2$  (also  $NO$ ) auf dem Wege über  $NH_3O + O_2$ ,  $N_2O$  dagegen über  $HNO$  entsteht, hat stützen lassen. Dies stimmt überein mit der Reaktionsfolge von K. A. Hofmann u. Mitarb., zumindest insofern, als diese es ablehnten,  $HNO$  als Zwischenprodukt bei der  $HNO_2$ -( $NO$ )-Bildung anzunehmen. Für die Bildung von  $HNO_2$  macht er den molekularen Sauerstoff verantwortlich. Das Schema nach I. M. Libinsson<sup>6)</sup>, das über  $N_2H_2$  und molekularen Sauerstoff zu  $N_2O$  führt, dürfte nicht den Tatsachen entsprechen<sup>7)</sup>.

---

1) A. v. Nagel, l.c.

2) A. v. Nagel, Z. phys. Ch. (B) 41 (1938) 71.

3) C. Kröger, l.c.

4) R. Schenck, Z.ang.Ch. 49 (1936) 649.

5) B. Neumann u. H. Rose, Z.ang.Ch. 33 I (1920) 41.

6) I. M. Libinsson, Journ.Chem.Ind. (Russ: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti) 8 (1931) 342.

7) Vgl. W. Krauss, l.c.

### Experimentelles

Die Methode der bei Atmosphärendruck durchgeführten Versuche war die folgende: die Gase,  $\text{NH}_3$ , Luft und so weit nötig auch  $\text{O}_2$ , gelangten durch die Strömungsmesser (1 u. 2, Fig. 1) in ein Mischgefäß (3) und über den Kontakt, der sich in dem elektrisch heizbaren Gefäß (4) befand. Der Strömungsmesser für  $\text{O}_2$  ist in der Abbildung fortgelassen. Aus der Strömungsgeschwindigkeit und der Versuchsdauer konnte die überführte Menge der Gase bestimmt werden. Sie betrug im allgemeinen für  $\text{NH}_3$  etwa  $750 \cdot 10^{-6}$  Mole pro Minute und für Luft etwa  $3750 \cdot 10^{-6}$  Mole pro Minute.

Der Kontakt bestand aus 2 - 3 mm großen Körnern, meist Preßlingen, des pulverförmigen Materials, und zwar in einer Höhe von ca. 20 mm aufgeschüttet. Das Reaktionsgefäß (4) hatte eine Höhe von 70 mm und einen Durchmesser von 27 mm. Die Temperatur wurde mit einem Cu-Constantan-Thermoelement gemessen.

Die Reaktionsprodukte  $\text{NO}$ ,  $\text{NO}_2$ ,  $\text{N}_2\text{O}$  einschließlich unverbrauchtes  $\text{NH}_3$  wurden, soweit sie durch flüssige Luft kondensierbar waren, in der Falle (5) aufgefangen. <sup>1)</sup> Diese war, um durch hinreichende Turbulenz der Gase bessere Kühlung und Kondensation zu erreichen, aus einer Reihe von Kugeln hergestellt. Die nicht ausfrierbaren Anteile - hauptsächlich  $\text{N}_2$ ,  $\text{O}_2$  und etwa  $\text{H}_2$  - gingen ins Freie. Von der Falle (5) konnten die kondensierten Produkte in die Falle (6) übergefroren werden, nachdem sie durch Abpumpen der restlichen permanenten Gase von diesen befreit waren. Hier wurde das etwa vorhandene  $\text{NO}$  zu  $\text{NO}_2$  durch Zugabe von Sauerstoff oxydiert. Dazu wurden die Reaktionsprodukte aufgetaut, eine Zeit sich selbst überlassen, wieder kondensiert und der restliche Sauerstoff abgepumpt. Da  $\text{NH}_3$  mit  $\text{NO}_2$  und dem gebildeten Wasser Nitrit und Nitrat bilden kann, wurde hierauf in den Fällen (5) und (6) geprüft. Sie konnten höchstens in Spuren nachgewiesen werden. Dies mag daran liegen, daß dort, wo  $\text{NO}_2$  auftrat, schon alles Ammoniak umgesetzt war.

Durch Überdestillieren aus fester Kohlensäure gelangte nun  $\text{NH}_3$  und  $\text{N}_2\text{O}$  in die mit flüssiger Luft gekühlte Falle (7), während  $\text{N}_2\text{O}_4$  und  $\text{N}_2\text{O}_3$  in der Falle (6) zurückblieben. Sie wurden nach Abnahme der noch gekühlten Falle mit einer bestimmten Menge  $n/10$ -Natronlauge aufgenommen und durch Rücktitration des Alkalis bestimmt. Die Gesamtmenge an  $\text{NH}_3$  und  $\text{N}_2\text{O}$  war nach Auftauen in Falle (7) aus dem bekannten Volumen (99,1 ccm), der Zimmertemperatur und dem am Manometer (8) abzulesenden Druck zu bestimmen.

Die sehr kleine Falle (9) (Inhalt ca. 3 ccm) diente dazu, um durch Überfrieren einen Teil der Gase abzunehmen und diese dann in die Gasbürette (10) zu drücken. Von hier aus wurde die Gasanalyse durch Absorption in Gaspipetten durchgeführt. Zur Kontrolle konnte das  $\text{N}_2\text{O}$  nach der Absorption des  $\text{NH}_3$  auch in das Zersetzungsgefäß (11) gebracht werden. Dieses enthielt einen elektrisch heizbaren Platindraht und das Manometer (12), an dem die Druckzunahme gemessen wurde.

1) Der Dampfdruck des  $\text{NO}$  bei der Temperatur der flüssigen Luft beträgt etwa 0,5 mm Hg. Bei den angewandten Verhältnissen wird daher ein Umsatz von weniger als etwa 1 % des angewandten Ammoniaks nicht erfaßt.




Abb. 1.


# Analytisches

Bestimmt wurden nur die ausfrierbaren Anteile der Reaktionsprodukte einschließlich dem etwa noch vorhandenen  $\text{NH}_3$ . Die nicht ausfrierbaren Gase konnten aus Stickstoff, entstandenem Wasserstoff und unverbrauchtem Sauerstoff bestehen. Sie wurden nicht analysiert, da durch die Verwendung von Luft ein sehr großer Ballast an Stickstoff vorhanden war, neben dem die in der Reaktion entstandenen permanenten Gase nur sehr ungenau hätten bestimmt werden können. Für unsere Versuche waren sie außerdem nicht von Interesse.

Die vorher beschriebene Trennung des  $\text{NO}$ ,  $\text{NO}_2$  und  $\text{N}_2\text{O}_3$  von  $\text{N}_2\text{O}$  durch Oxydation des  $\text{NO}$  und Abdestillation des  $\text{N}_2\text{O}$  erfolgte mit für unsere Zwecke hinreichender Genauigkeit, wie die folgenden Kontrollversuche zeigen. Zur Analyse gelangte ein Gemisch von  $\text{NO} : \text{N}_2\text{O} = 1 : 1$ , das nach der vorgenannten Trennungsmethode behandelt wurde. Es wurde wieder gefunden in % der angewandten Menge (abgerundete Zahlen):

|            | $\text{NO}$         | $\text{N}_2\text{O}$ |
|------------|---------------------|----------------------|
| 1. . . . . | 100 . . . . .       | 100                  |
| 2. . . . . | 96 . . . . .        | 100                  |
| 3. . . . . | <u>99</u> . . . . . | <u>99</u>            |
| Mittel:    | 98                  | 99                   |

Die Trennung von  $\text{NH}_3$  und  $\text{N}_2\text{O}$  war eine normale Gasanalyse. Zuerst wurde  $\text{NH}_3$  durch Absorption in Phosphorsäure bestimmt. Schwefelsäure konnte hier nicht verwandt werden, da sie nach Versuchen von O e s t e r h e l d <sup>1)</sup>  $\text{N}_2\text{O}$  absorbiert. Phosphorsäure tut dies nicht, absorbiert aber  $\text{NH}_3$  vollkommen. Ein Versuch über die Löslichkeit von  $\text{N}_2\text{O}$  in Phosphorsäure ergab, daß sich von den 27 ccm angewandten Stickoxyduls nach 25 Minuten 0,0 ccm gelöst hatten. Ammoniak wird dagegen momentan absorbiert.  $\text{N}_2\text{O}$  konnte dann durch Absorption in Alkohol oder auch zur Kontrolle durch Zersetzung (10 Min.) an einem heißen Platindraht (ca.  $1300^\circ\text{C}$ ) in dem Gefäß (11) bestimmt werden. Die Menge ergibt sich aus der Druckzunahme gemäß



Die Kontrolle der Bestimmung von  $\text{N}_2\text{O}$  durch Absorption in Alkohol und durch Zersetzung ergab, bezogen auf 100 angewandtes  $\text{N}_2\text{O}$  (abgerundete Zahlen):

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| durch Absorption bestimmt: | 100       |
| durch Zersetzung bestimmt: | <u>96</u> |
| Differenz:                 | 4         |

1) G. Oesterheld, Z.anorg.Ch. 86 (1914) 105.

Die Differenz mag zum Teil dadurch bedingt sein, daß die Zersetzung am Ende sehr langsam geht, und der vollkommene Zerfall erst nach langer Zeit eintritt. Dieser Endpunkt wurde nicht abgewartet, da diese Methode nur die Werte der immer durchgeführten Absorption in Alkohol kontrollieren sollte.

Bei allen Versuchen trat bei dem Stickoxydul stets ein nicht absorbierbarer Rest auf, von dem angenommen werden mußte, daß er aus  $N_2$  bestand. Untersuchungen, ob etwa Stickstoff neben  $N_2O$  bei der Temperatur der flüssigen Luft in größeren Mengen adsorbiert wird, wurden so angestellt, daß  $N_2O$  ausgefroren und langsam Stickstoff von etwa 230 mm Druck hinzugegeben wurde. Nach etwa 15 Minuten wurde der Stickstoff in der Gasphase abgepumpt und das  $N_2O$  in der üblichen Weise durch Absorption in Alkohol bestimmt.

Angewandtes  $N_2O$  = 100 %

Gefunden nach Stehen mit  
Stickstoff in flüss. Luft

1. 97 %

2. 93 %

---

Mittel 95 %

Der Stickstoffdruck entspricht etwa dem bei den Versuchen vorhandenen. In der in der Falle (7) ermittelten Gesamtmenge an  $NH_3$  und  $N_2O$  kann also etwas Stickstoff enthalten sein. Dies stört unsere Berechnung jedoch nicht, da ja aus dem analytisch bestimmten Gehalt des Gases an  $N_2O$  und  $NH_3$  die tatsächlich ausgefrorenen Mengen bestimmt werden konnten.

### V Versuchsergebnisse

Bei den im Folgenden beschriebenen Versuchen sind die gerundeten Reaktionsprodukte einschließlich dem eventuell noch vorhandenen  $NH_3$  für je 100 angewandtes Ammoniak angegeben. Bei der Berechnung für  $N_2O$  wurde die Absolutmenge  $N_2O$  verdoppelt, da  $1/2 N_2O + 1 NH_3$  entspricht. Die Zusammensetzung des Gasgemisches  $NH_3$  - Luft entsprach  $NH_3 : O_2 = 1 : 1$  ( $2 NH_3 + 2 O_2 = N_2O + 3 H_2O$ ). Da vergleichbare Verhältnisse bei allen Katalysatoren vorliegen sollten, wurde dieses Verhältnis nicht variiert. Lediglich bei einigen Versuchen mit Nickeloxyd-Kontakten ist durch Zusatz von  $O_2$  zum  $NH_3$ -Luft-Gemisch unter Beibehaltung der Gesamtströmungsgeschwindigkeit das Mischungsverhältnis  $NH_3 : O_2$  von 1 : 1 bis 1 : 3 variiert worden. Zur Vertreibung der Luft strömte das Gasgemisch vor Beginn des eigentlichen Versuches einige Zeit über den erhitzten Kontakt.

Im Text ist von einer tabellenmäßigen Darstellung abgesehen, da die Kurven mit hinreichender Genauigkeit die Ergebnisse wiedergeben und anschaulicher sind als das reine Zahlenmaterial. Dieses ist am Ende der Arbeit zusammengestellt. Bei den Abbildungen finden sich Angaben, aus welcher Tabelle die Werte entnommen sind. Die Abszissen der Kurven sind die Temperaturen in  $^{\circ}C$ , die Ordinaten die Ausbeuten an den analysierten Stoffen,  $N_2O$ ,  $NO$  bzw. noch vorhandenem  $NH_3$ , bezogen auf 100 angewandtes Ammoniak.

# Manganoxyd-Kontakte

Zunächst wurde das schon von A. v. Nagel<sup>1)</sup> als geeigneter Kontakt zur Stickoxydul-Bildung erkannte  $MnO_2$  noch einmal untersucht. Da die Beständigkeitsbereiche der Oxydstufen über das hier in Frage kommende Temperaturgebiet gut untersucht sind<sup>2)</sup>, war es möglich, die  $N_2O$ -Bildung in Zusammenhang mit der Beständigkeit der verschiedenen Oxyde zu bringen. Auch konnte der Einfluß der Zersetzungstemperatur des Katalysators auf die  $N_2O$ -Bildung leicht untersucht werden.

Als Katalysatormaterial wurden verwandt:

1. Pyrolusit gekörnt (ca. 80 % Kahlbaum),
2. Pyrolusit gepulvert und zu Pillen gepreßt,
3.  $MnO_2$  gefällt (nicht alkalifrei, Kahlbaum) und gepreßt,
4. diese Oxyde mit einem Zusatz von Kaliumhydroxyd,
5. das Abbauprodukt des  $MnO_2$ , das  $Mn_2O_3$ .

Die Versuche zeigen, daß die Herstellungsart des Katalysators keinem allzu großen Einfluß auf die katalytische Wirksamkeit hat. Abb. 2 gibt die Ausbeute an  $N_2O$ , NO sowie den Ammoniakumsatz (Ordinate) als Funktion der Temperaturzunahme (Abszisse) an. Es wurde hier gekörnter sowie gepulverter und dann gepreßter Pyrolusit verwandt. Die Maxima liegen praktisch gleich, nur ist bei gepulvertem Pyrolusit der Beginn der  $N_2O$ -Bildung etwas nach höheren Temperaturen verschoben. Der Abfall der  $N_2O$ -Kurve liegt bei beiden gleich, ebenso der Beginn der NO-Kurve.




Abb. 2. (Vgl. Tab. 1 u. 2.)

- 1) A. v. Nagel, Z. Elektroch. 36 (1930) 754.
- 2) A. Simon, F. Feher, Z. Elektroch. 28 (1932) 137.  
M. le Blanc, G. Wehner, Z. phys. Ch. (A) 168 (1934) 59.  
C. Drucker, R. Hüttner, Z. phys. Ch. 131 (1927) 237.

Weiterhin wurde gefälltes  $MnO_2$ , das zu Pillen gepreßt war, untersucht. Das  $N_2O$ -Maximum in Abb. 3 war hier zu tieferen Temperaturen verschoben, seine Höhe jedoch dieselbe wie bei Pyrolusit. Der Beginn der  $NO$ -Bildung lag bei tieferen Temperaturen als beim Pyrolusit. Die Herstellung durch Pressen konnte diese Änderung nicht hervorrufen, da beim Pyrolusit kein Unterschied zu erkennen war. Es ist anzunehmen, daß das Alkali, das in gefälltem  $MnO_2$  stets vorhanden ist, die Ursache hierfür war. Zur Prüfung der Annahme wurde dem  $MnO_2$  etwa 10 %  $KOH$  zugesetzt. Die Versuche ergaben, daß die Temperatur der maximalen  $N_2O$ -Ausbeute gegenüber  $MnO_2$  (gefällt) erhalten bleibt. Die Ausbeute geht aber etwas zurück, und es tritt eine höhere  $NO$ -Ausbeute bei tieferen Temperaturen als bei  $MnO_2$  ohne  $KOH$ -Zusatz ein. Das bedeutet, daß hier durch das Alkali eine Reaktion in den Vordergrund treten muß, die einen starken Verbrauch des  $NH_3$  bzw.  $HNO$  zu  $NO$  zur Folge hat.

Für  $NH_3O$  ist in Gegenwart von Alkali bekannt, daß es mit Luftsauerstoff  $HNO_2$  ( $NH_3O + O_2 = HNO_2 + H_2O$ ) leichter gibt als ohne Alkali <sup>1)</sup>. Während die Versuche von K. A. Hofmann und Mitarbeitern <sup>1)</sup>, die mit einem sehr großen Überschuß an Alkali angestellt, zu einer Nitrit- bzw. Nitratbildung in der Katalysatormasse führten, war das hier nicht der Fall. Eine Untersuchung des Katalysators auf Nitrat und Nitrit ergab nur die Anwesenheit sehr geringer Nitritmengen, die aber nur einen ganz kleinen Bruchteil der jeweils gefundenen Menge Stickoxyd darstellten. Hieraus folgt gleichzeitig, daß der in den Darstellungen fehlende Rest zu 100 % Stickstoff ist. <sup>2)</sup> Die Ergebnisse dieser Versuche sind in Abb. 3 dargestellt.




Abb. 3. (Vgl. Tab. 3 u. 4.)

Wir haben, um diesen Alkalieffekt zu untersuchen, die Versuche mit Pyrolusit, der zunächst gepulvert und gepreßt war, mit einem Zusatz von 7,7 g  $KOH$  auf 45 g Pyrolusit wiederholt, weil uns beim Pyrolusit bekannt war, daß die Herstellung keinen Einfluß auf die  $N_2O$ -Bildung ausübt. Diese Versuche gibt Abb. 4 wieder.

- 1) K. A. Hofmann, L. Leschewski, W. Lemme, H. Galotti, K. Mayer, W. Gundelach, Ber. 60 (1927) 1190.
- 2) Da dieser das einzige Produkt ist, das wir hier nicht erfaßt haben.




Abb. 4. (Vgl. Tab. 5.)

Das Ergebnis war wie erwartet. Die NO-Kurve wird zu tieferen Temperaturen verschoben, gleichzeitig wird die N<sub>2</sub>O-Bildung auf einen engeren Temperaturbereich zusammengedrängt. Die Oxydation fängt erst bei etwas höheren Temperaturen an, wie der NH<sub>3</sub>-Verbrauch zeigt. Das Alkali fördert die bekannte Reaktion



Die salpetrige Säure zerfällt unter unseren Bedingungen weiter zu Stickoxyd.

Von K. A. Hofmann u. Mitarb. (l.c.) wurde die Bildung von Nitrit und Nitrat an alkalihaltigen Kontakten als Beweis für die Reaktion  $\text{NH} + \text{O}_2 = \text{HNO}_2$  und somit für NH als Zwischenprodukt der Ammoniakoxydation an alkalischen Kontakten angesehen. Bestärkt wurden die Verfasser durch die von ihnen untersuchte Oxydation von Hydroxylamin an alkalischen Kontakten, die zu HNO<sub>2</sub> führte, wobei NH<sub>2</sub>OH zerfallen soll nach  $\text{NH}_2\text{OH} \rightarrow \text{NH} + \text{H}_2\text{O}$ . Unsere Versuche stimmen hiermit überein mit der Ausnahme, daß der Kontakt kein Nitrit mehr enthält. Dies dürfte aber in dem relativ geringen Zusatz von Alkali (ca. 10 %) gegenüber 90 % bei K. A. Hofmann zu suchen sein. Auf jeden Fall ist daher anzunehmen, daß ein Teil unseren NH<sub>3</sub>O nach der Reaktion



reagiert hat. Die Annahme Andrusows<sup>1)</sup>, daß die Nitritbildung über  $\text{HNO} + \text{KOH} = \text{KNO}_2 + \text{H}_2$  unmittelbar zu einem Nitrit ohne den Umweg über HNO<sub>2</sub> führt, dürfte durch die hier gefundene NO-Bildung widerlegt sein, da eine Zersetzung des gebildeten KNO<sub>2</sub> zu Stickoxyden, die dann ihrerseits mit H<sub>2</sub>O HNO<sub>2</sub> ergeben, nach den Versuchen von K. A. Hofmann nicht wahrscheinlich ist. Gerade in der Katalysatormasse wurde das Nitrit gefunden. HNO ist ein Zwischenprodukt auf dem Wege zur N<sub>2</sub>O- oder N<sub>2</sub>-Bildung, nicht aber zur NO-Bildung, wie früher schon von M. Bodenstein<sup>2)</sup>

1) L. Andrusow, Z. anorg. Ch. 166 (1927) 60.

2) M. Bodenstein, Trans. Am. Elektroch. Soc. 71 (1937) 353.

ausgeführt wurde. Der bei niederen Temperaturen auftretende Stickstoff dürfte vielleicht nach  $\text{NH}_3\text{O} + \text{HNO} = \text{N}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$  gebildet sein. Es sind hier schon genügend O-Atome vorhanden, um  $\text{NH}_3\text{O}$  zu bilden, doch ist ihre Konzentration noch nicht so groß, daß die Reaktion  $2 \text{HNO} = \text{N}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$  hervortritt, die größere Mengen  $\text{HNO}$  erfordert.  $\text{NH}_3\text{O}$  wird gebildet, sobald überhaupt oxydativer Ammoniakverbrauch an diesen Kontakten einsetzt, d.h. gelockerte O-Atome vorhanden sind.

In diesem Zusammenhang wurde auch der Zerfall von  $\text{N}_2\text{O}$  an diesen Kontakten untersucht. Hier ging ein Gemisch  $\text{N}_2\text{O}$ -Luft ( $\text{N}_2\text{O} : \text{O}_2 = 1 : 1$ ) mit der gleichen Geschwindigkeit wie das  $\text{NH}_3$ -Luft-Gemisch über den Kontakt. Die Ergebnisse an  $\text{MnO}_2$  (Pyrolusit) sowie  $\text{Mn}_2\text{O}_3$  sind in Abb. 5 wiedergegeben.




Abb. 5. (Vgl. Tab. 6.)

Der  $\text{N}_2\text{O}$ -Zerfall bei  $\text{MnO}_2$  und  $\text{Mn}_2\text{O}_3$  fällt praktisch zusammen und in das Gebiet von  $450 - 550^\circ\text{C}$ . Bei den  $\text{NH}_3$ -Oxydationsversuchen wurde der  $\text{N}_2\text{O}$ -Abfall ebenfalls im Gebiet von  $450 - 550^\circ\text{C}$  gefunden. Erst bei  $500^\circ$  tritt langsam die  $\text{NO}$ -Bildung auf, sodaß ein wesentlicher Teil der Stickstoffbildung hier vom  $\text{N}_2\text{O}$ -Zerfall herühren muß. Gleichzeitig fällt der  $\text{N}_2\text{O}$ -Zerfall in das Gebiet, in dem sich unter unseren  $\text{O}_2$ -Drucken die Umwandlung von  $\text{MnO}_2$  in  $\text{Mn}_2\text{O}_3$  vollzieht, dessen aktive O-Atom-Konzentration viel kleiner ist als die des  $\text{MnO}_2$ .

In dem gleichen Temperaturbereich wurde das Abbauprodukt des  $\text{MnO}_2$ , das  $\text{Mn}_2\text{O}_3$ , als Katalysator untersucht, um zu sehen, ob sich das Gleichgewicht  $2 \text{MnO}_2 = \text{Mn}_2\text{O}_3 + 1/2 \text{O}_2$  bzw. eines aktiven Sauerstoff enthaltenden Oxydes schnell einstellt. Bei schneller Einstellung war zu erwarten, daß auch  $\text{Mn}_2\text{O}_3$   $\text{N}_2\text{O}$  lieferte, was es tatsächlich auch tut. Die Ergebnisse sind in Abb. 6 wiedergegeben.

Die Strömungsgeschwindigkeit und Gaszusammensetzung waren die gleichen wie früher. Zum Vergleich ist die Pyrolusit-Kurve eingetragen. Das Maximum der  $\text{N}_2\text{O}$ -Bildung liegt im gleichen Temperaturintervall wie bei Pyrolusit, die Ausbeuten sind etwas geringer, was verständlich ist, da das  $\text{Mn}_2\text{O}_3$  nicht vollständig zu  $\text{MnO}_2$  wird. Mit genügender Geschwindigkeit stellt sich jedoch eine stationäre O-Atom-Konzentration ein, die die  $\text{N}_2\text{O}$ -Bildung zur Folge hat. Die  $\text{NO}$ -Bildung ist dagegen zu tieferen Temperaturen verschoben. Das bedeutet, daß hier die Atomkonzentration des




Abb. 6. (Vgl. Tab. 7.)

Sauerstoffs nicht ausreicht, den größten Teil des  $\text{NH}_3\text{O}$  in  $\text{HNO}$  überzuführen, sondern daß die Lebensdauer des  $\text{NH}_3\text{O}$  genügend groß ist, um die Reaktion  $\text{NH}_3\text{O} + \text{O}_2 = \text{HNO}_2 + \text{H}_2\text{O}$  wesentlich hervortreten zu lassen.

Weiterhin wurde untersucht, ob die O-Atom-Konzentration des  $\text{MnO}_2$  genügend groß ist, um auch schon ohne Zusatz von Luftsauerstoff Ammoniak zu oxydieren. Ein Gemisch von  $\text{NH}_3$  und  $\text{N}_2$  vom gleichen Verhältnis wie das  $\text{NH}_3$ -Luft-Gemisch und von derselben Strömungsgeschwindigkeit ging über den Kontakt. Zwischen jedem Versuch wurde zur Aufoxydation etwa 20 Minuten Luft über den erhitzten Kontakt geblasen, danach etwa 15 Minuten reiner Stickstoff, um alle Luft zu entfernen, und schließlich wieder das  $\text{NH}_3$ - $\text{N}_2$ -Gemisch. Die Ergebnisse gibt Abb. 7 wieder.




Abb. 7. (Vgl. Tab. 8.)

Die  $\text{N}_2\text{O}$ -Bildung tritt wieder stark im gleichen Temperaturgebiet wie bei dem Luftgemisch auf. Danach ist also die O-Atom-Konzentration genügend hoch, um eine  $\text{N}_2\text{O}$ -Bildung zu bewirken. Die in Abb. 7 mit  $\times$  bezeichneten Werte wurden zur Kontrolle mit Luftgemisch gemacht, um zu zeigen, daß der Kontakt keine Änderung erfahren hatte. Mit diesem Befunde werden die Literaturangaben <sup>1)</sup> be-

1) Gmelins Handbuch der anorg. Ch. 8.Aufl. N S. 490.

richtigt, die besagen, daß die Oxydation von Ammoniak an  $\text{MnO}_2$  ohne Luft oder Sauerstoff zu Stickstoff führen.

Nunmehr soll ein Zusammenhang zwischen der  $\text{N}_2\text{O}$ - bzw.  $\text{NO}$ -Bildung und den Stabilitätsbereichen der verschiedenen Manganoxyde gegeben werden. Aus Untersuchungen verschiedener Autoren <sup>1)</sup> ist hier das Stabilitätsdiagramm der Oxyde des Mangans aufgestellt.




Abb. 8. Stabilitätsdiagramm der Manganoxyde.

Bis 500° C besteht eine reversible Sauerstoffabgabe mit Umwandlung in  $\text{Mn}_2\text{O}_3$ , die wir ja auch aus unseren Versuchen mit  $\text{Mn}_2\text{O}_3$  selbst geschlossen haben. Oberhalb 500° setzt eine irreversible Sauerstoffabgabe ein. Hier wurde vorwiegend im reversiblen Gebiet gearbeitet. Bei ungefähr 300° liegt ein Gebiet, in dem das Oxyd  $\text{MnO}_2 - x\text{O}$  vorhanden ist. In Abb. 8 sind unter der Abszisse (Temperatur) die Stabilitätsbereiche der verschiedenen Oxyde angegeben. Die Ordinaten sind:

1. die Ausbeuten an  $\text{NH}_3$ ,  $\text{N}_2\text{O}$  und  $\text{NO}$ ,
2. der Sauerstoffdruck des Oxydes in mm Hg,
3. der O-Atom-Gehalt pro 1 Mn beim isobaren Abbau.

Der isobare Abbau beginnt etwa bei 300° und ist bei 500° mit einem Oxyd, das 1.5 O-Atome auf 1 Mn enthält ( $\text{Mn}_2\text{O}_3$ ), beendet, wie die Kurve für den isobaren Abbau zeigt. In diesem Gebiet liegt, wie zu erwarten war, die  $\text{N}_2\text{O}$ -Bildung entsprechend der genügend hohen O-Atom-Konzentration. Unser Gasgemisch hat im Höchstfalle einen Sauerstoffdruck von 140 mm Hg, der aber am Kontakt selbst durch die Reaktion geringer ist. Von der Sauerstoffdruck-Kurve des  $\text{MnO}_2$  wird bei 400° der Wert von 140 mm Hg erreicht. Oberhalb ist daher in jedem Falle eine Umwandlung des Oxydes zu erwarten. Die

- 1) A. Simon, F. Feher, l.c.  
M. le Blanc, G. Wehner, l.c.  
C. Drucker, R. Hüttner, l.c.

- 2) Das Oxyd hat das Gitter des  $\text{MnO}_2$ , aber einen Unterschuß an  $\text{O}_2$ .

O-Atom-Konzentration nimmt nun ab, und von 500° an tritt die NO-Bildung auf, welche ja an hinreichende Mengen O<sub>2</sub> und nicht an sehr große O-Atom-Konzentrationen geknüpft ist. Daß die Sauerstoff-tension im Zusammenhang mit der Konzentration der in ihren Gitterpunkten nicht mehr festgehaltenen O-Atome steht, führte schon F i s c h b e c k <sup>1)</sup> aus. Er nimmt an, daß beim Dissoziations-vorgang die O-Atome zunächst gelockert werden, bis sie praktisch frei sind und dann erst die Molekülbildung einsetzt.

Die Untersuchungen an MnO<sub>2</sub> und Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ergeben zusammenfassend folgendes Bild:

1. An MnO<sub>2</sub> tritt in Übereinstimmung mit A. v. Nagel starke N<sub>2</sub>O-Bildung auf. Sie erstreckt sich von 200 bis 500° mit einem Maximum bei 350°. Die NO-Bildung setzt erst bei 500° ein.
2. In der Kontaktmasse befindet sich kein Nitrat oder Nitrit.
3. Der Zusatz von Alkali bedingt eine Verschiebung des Beginns der NO-Ausbeute zu tieferen Temperaturen, während die N<sub>2</sub>O-Ausbeute etwas geringer wird; ihr Maximum hingegen liegt bei der gleichen Temperatur wie bei reinem MnO<sub>2</sub>.
4. Die Verschiebung der NO-Ausbeuten muß auf ein starkes Hervortreten der Reaktion




zurückzuführen sein. Diese Annahme ist in Übereinstimmung mit Versuchen von K. A. Hofmann u. Mitarb. an alkalischen Kontakten. Sie spricht gegen die Annahme von L. A n d r u s s o w <sup>2)</sup>, daß eine Reaktion  $\text{HNO} + \text{KOH} = \text{KNO}_2 + \text{H}_2$  stattfindet. HNO ist das Zwischenprodukt auf dem Wege zu N<sub>2</sub>O bzw. N<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>O dagegen führt zu HNO<sub>2</sub> bzw. NO und NO<sub>2</sub>.

5. Bei Verwendung von Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> als Kontakt tritt ebenfalls im gleichen Temperaturbereich wie bei MnO<sub>2</sub> N<sub>2</sub>O auf. Dies rührt daher, daß der Sauerstoff aus dem Gasgemisch sehr schnell in aktiver Form, und zwar reversibel aufgenommen wird.
6. Das Zustandsdiagramm der Manganoxyde zeigt in dem untersuchten Temperaturgebiet eine reversible Sauerstoffaufnahme und -abgabe. Zugleich rechtfertigt die Sauerstofftension über MnO<sub>2</sub> die Annahme, daß eine große O-Atom-Konzentration vorhanden sein muß.
7. Direkt wird dies bestätigt durch die Oxydation von Ammoniak durch MnO<sub>2</sub> in Abwesenheit von Sauerstoff, die im Gegensatz zur Literatur in diesem Gebiet zu reichlichen N<sub>2</sub>O-Ausbeuten führt.
8. Es spielen sich demnach am Kontakt folgende Reaktionen ab:

---

1) K. Fischbeck, Z. Elektroch. 35 (1929) 607.

2) L. Andrussow, l.c.



9. Das Unterbleiben der Bildung von  $\text{N}_2$  bei tiefer Temperatur, wie von K. A. Hofmann und Mitarbeitern gefunden wurde, kann daher kommen, daß das  $\text{NH}_3\text{O}$  durch Reaktion (3) am alkalisch gemachten Oxydkontakt verbraucht wird, und braucht nicht, wie Andrussow <sup>1)</sup> annimmt, auf einer Reaktion  $\text{HNO} + \text{NaOH}$  zu beruhen.

Da mit aller Wahrscheinlichkeit die Bildung von  $\text{N}_2\text{O}$  an eine gewisse Konzentration von leicht beweglichen Sauerstoffatomen geknüpft ist, lag es nahe, nun solche Oxyde als Kontakt zu verwenden, die Sauerstoff in atomarer Form in ihre Gitter einlagern, ohne die Gitterstruktur zu ändern. Das sind Oxyde, bei denen der Sauerstoff an sogenannten Fehlordnungsstellen eingebaut ist. Es müßte dann ein direkt proportionaler Zusammenhang zwischen der O-Atomkonzentration, die sich bei gegebenem Gasgemisch und Temperatur einstellt, und der  $\text{N}_2\text{O}$ -Ausbeute bestehen.

Es handelt sich hier um Oxyde wie  $\text{MnO}$ ,  $\text{CoO}$ ,  $\text{NiO}$ , bei denen le Blanc und Mitarbeiter <sup>2)</sup> nachweisen konnten, daß sie mit Sauerstoff Verbindungen der Form  $\text{MeO} \cdot x\text{O}$  bilden, d.h. es ist Sauerstoff über das stöchiometrische Verhältnis hinaus in das Gitter des Metalloxydes eingebaut. Von einer bestimmten O-Konzentration jedoch an lagert sich das Gitter in das des nächst höheren Oxydes um und kann dabei zunächst eine Verbindung der Form  $\text{MeO}_y \cdot x\text{O}$  bilden, d.h. in dem Gitter des höheren Oxydes fehlen noch O-Atome zum stöchiometrischen Verhältnis. Allein beim Nickeloxyd existiert nach le Blanc und H. Sachse <sup>3)</sup> nur das Oxyd  $\text{NiO}$ , sodaß alle höheren Oxyde Substanzen der Form  $\text{NiO} \cdot x\text{O}$  darstellen. Hier müßte es also möglich sein, einen quantitativen Zusammenhang zwischen der O-Atomkonzentration und der  $\text{N}_2\text{O}$ -Ausbeute zu bestimmen, denn der gesamte zu bestimmende Sauerstoff liegt aktiv und atomar vor und ist analytisch bestimmbar.

Soll auf diese Weise die aktive Sauerstoffkonzentration am Kontakt hergestellt und die Beziehung zwischen dieser und der  $\text{N}_2\text{O}$ -Ausbeute gefunden werden, so muß man annehmen, daß die O-Atomkonzentration an der Oberfläche des Kontaktes proportional der im Innern ist, und das sich das Gleichgewicht zwischen Oberfläche und Inneren schnell einstellt. Diese Voraussetzung wird im Folgenden gemacht werden.

1) L. Andrussow, l.c.

2) M. le Blanc, G. Wehner, l.c.

M. le Blanc, H. Sachse, Z. Elektroch. 32 (1926) 58 u. 204.

M. le Blanc, E. Möbius, Z. phys. Ch. (A) 142 (1929) 151.

3) M. le Blanc, H. Sachse, l.c.

Zur Bestimmung des aktiven Sauerstoffs in den Metalloxyden wurde die Methode, die von M. le Blanc u. H. Sachse und H. Sachse<sup>1)</sup> ausgearbeitet worden ist, angewandt. Sie beruht auf der Tatsache, daß der aktive Sauerstoff aus salzsaurer KJ-Lösung Jod ausscheidet, welches titriert werden kann.

Dazu wurde eine bestimmte Menge des Oxydes in einer Art Waschflasche, deren Zu- und Ableitungsrohr mit einem Hahn versehen war, mit etwa 30 ccm 1/10 n Kaliumjodid-Lösung und 150 ccm verdünnter Salzsäure versetzt. Darauf wurde zur Entfernung des Luftsauerstoffes etwa 30 Minuten reiner Stickstoff durchgeleitet und die Hähne geschlossen. Nach 48 Stunden konnte das ausgeschiedene Jod mit Natriumthiosulfat titriert werden. Da Nitrat oder Nitrit ebenfalls mit Kaliumjodid reagieren, wurde jeweils geprüft, ob diese Substanzen im Kontakt vorhanden waren. Sie wurden in keinem Falle gefunden.

### MnO · xO - Kontakt

Wird MnO als Kontakt verwandt, so muß sich während der Versuche das MnO langsam zum MnO·xO bzw. einer höheren Oxydationsstufe aufoxydieren.

Zur Ausführung dieser Versuche wurde ein MnO nach den Angaben von Le Blanc u. Wenner<sup>2)</sup> aus Mangancarbonat bei etwa 600° C hergestellt. Es hatte die dort angegebene Farbe und wurde an der Luft bei Zimmertemperatur sofort dunkel, enthielt also zu Anfang schon etwas aktiven Sauerstoff, was unsere Versuche aber nicht störte. Die Versuchsbedingungen waren die gleichen wie früher. Die Temperatur war bei allen Versuchen konstant 360° C, weil dort etwa das Maximum der N<sub>2</sub>O-Ausbeute für Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und MnO<sub>2</sub> liegt. Die Abb. 9 zeigt, daß mit jedem Versuch die erhaltene N<sub>2</sub>O-Menge steigt, um schließlich einen konstanten Wert anzunehmen, wenn sich ein stationärer Zustand des Katalysators hergestellt hat.




Abb. 9. (Vgl. Tab. 9.) (Bei konst. Temp. 360° C)

MnO N<sub>2</sub>O-Ausbeute in Abhängigkeit von der Nr. des Versuches.  
(bzw. MnO·xO) (Diese ist proportional der Reaktionszeit d. Gasgem. m. d. Kontakt.)

- 1) M. le Blanc, H. Sachse, Z. Elektroch. 32 (1926) 58.  
H. Sachse, Dissertation Leipzig 1925.
- 2) M. le Blanc, G. Wehner, Z. phys. Ch. (A) 168 (1934) 59.

Vor und nach den Versuchen wurde je eine Probe des Kontaktes auf aktiven Sauerstoff untersucht. Sie ergaben:

vorher: 1.3 Gew.-% akt. Sauerstoff,  
nachher: 6.3 " " " " " "

Es muß dabei bemerkt werden, daß der zweite Wert nicht etwa durch Nitrat oder Nitrit, das im Kontakt vorhanden sein konnte, gefälscht ist, da eine Untersuchung auf diese Substanzen negativ verlief. Die Ergebnisse zeigen, daß die O-Atom-Konzentration mit den Versuchen größer geworden und gleichzeitig mehr  $N_2O$  entstanden ist.

Mit dem aufoxydierten  $MnO \cdot xO$ -Kontakt wurden nun noch Versuche bei verschiedenen Temperaturen gemacht. Es zeigte sich, daß die  $N_2O$ -Ausbeuten etwa dieselbe Größe haben und im gleichen Temperaturgebiet liegen wie die beim  $Mn_2O_3$ . Gegenüber  $MnO_2$  sind sie zu tieferen Temperaturen verschoben (Abb. 9 a.).




Abb. 9 a. (Vgl. Tab. 10.)

### Kobaltoxyd-Kontakte

Am  $CoO$  wurden die Versuche genauer wiederholt, indem jetzt die Zeit, die das Gasgemisch über den Kontakt strömte, gemessen wurde. Zwischen den einzelnen Versuchen strömte das Gasgemisch über den Kontakt, ohne analysiert zu werden. Die Zeiten hierbei wurden ermittelt. Es ergab sich dasselbe Bild wie bei  $MnO$ . Das Oxyd wurde aus Kobaltkarbonat nach le Blanc u. E. Möbius (l.c.) bei 500°C dargestellt. Die Versuchstemperatur war konstant 330°C. Die Versuchsergebnisse gibt Abb. 10 wieder.




Abb. 10. (Vgl. Tab. 11.)

$CoO$  (bzw.  $CoO \cdot xO$ ):

$N_2O$ - und  $NO$ -Ausbeute in Abhängigkeit von der Reaktionszeit des  $NH_3$ -Luftgemisches mit dem Kontakt bei °C

Die  $\text{N}_2\text{O}$ -Ausbeute steigt, wie man sieht, mit der Zeit und erreicht ihr Maximum nach etwa 90 Minuten. Der aktive Sauerstoff ist während dessen von 0.9 auf 4.0 Gew.-% gestiegen. Gleichzeitig tritt auch etwas  $\text{NO}$  auf.

Nach le Blanc u. Möbius nimmt auch das käufliche " $\text{Co}_2\text{O}_3$ " aktiven Sauerstoff auf. Zur Vervollständigung des Bildes sollten daher auch an diesem Oxyd Versuche ausgeführt werden. Es wurde die Abhängigkeit der Oxydationsprodukte des Ammoniaks von der Temperatur in der üblichen Weise und mit den gleichen Versuchsbedingungen wie früher bestimmt.




Abb. 11. (Vgl. Tab. 12.)

Die Abbildung zeigt: es entsteht tatsächlich  $\text{N}_2\text{O}$  zwischen etwa  $180^\circ$  und  $450^\circ$  C. Daneben findet sich auch  $\text{NO}$  in steigenden Mengen von etwa  $250^\circ$  an. Es tritt wieder die Reaktion  $\text{NH}_3 + \text{O}_2 = \text{HNO}_2 + \text{H}_2\text{O}$  durch die wahrscheinlich nicht allzu große O-Atom-Konzentration wie beim  $\text{Mn}_2\text{O}_3$  schon früh auf. Vielleicht ist dieser Kontakt nicht ganz alkalifrei gewesen.

### Nickeloxyd - Kontakte

Nach M. le Blanc und H. Sachse <sup>1)</sup> kann  $\text{NiO}$  bis zu etwa 1.05 O-Atome einlagern, ohne das Gitter zu ändern, d.h. ohne ein höheres definiertes Oxyd zu bilden. Es handelt sich dabei um eine Fehlordnung im Sinne von C. Wagner <sup>2)</sup>. Hier muß es also möglich sein, einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der O-Atom-Konzentration und der  $\text{N}_2\text{O}$ -Ausbeute zu finden.

Die Darstellung des Oxydes erfolgte in der von M. le Blanc und H. Sachse angegebenen Weise aus Nickelkarbonat bei  $500^\circ$  C. Das Produkt war nach dem Zugeben von Luft bei Zimmertemperatur dunkelgrau gefärbt, enthielt also etwas aktiven Sauerstoff. Um nun den gesuchten Zusammenhang aufzufinden, wurde unserem  $\text{NH}_3$ -Luftgemisch Sauerstoff in variabler Menge zugesetzt, wobei die Gesamtströmungsgeschwindigkeit die gleiche der früheren Versuche war. Es muß sich so für jeden Sauerstoffdruck nach gewisser Zeit eine entsprechende stationäre O-Atom-Konzentration einstellen. Die Reversibilität der aktiven O-Atomkonzentration zeigt Tabelle 13, bei der die Versuche in der angegebenen Reihenfolge gemacht sind. Der erste und letzte Versuch sind mit dem gleichen Verhältnis  $\text{NH}_3 : \text{O}_2 = 1 : 1$  gemacht und stimmen praktisch überein.

Die Versuche wurden so ausgeführt, daß das jeweilige Gasgemisch 40 Minuten über den Kontakt strömte, ehe der eigentliche

1) M. le Blanc, H. Sachse, l.c.

2) C. Wagner, Phys. Z. 36 (1935) 721.

Versuch begann. Nach dieser Zeit war, wie Vorversuche zeigten, der stationäre Zustand erreicht. Nach dem Versuch wurde dem Kontakt jedesmal eine Probe entnommen, um den aktiven Sauerstoff und eventuell vorhandenes Nitrat oder Nitrit zu bestimmen, die jedoch beide nicht zugegen waren.

Die Ergebnisse sind in den Abb. 12 - 14 wiedergegeben. Es sind für dieselbe Versuchsreihe die Beziehungen zwischen aktiver Sauerstoff-Konzentration und der  $N_2O$ -Ausbeute (Abb. 12), zwischen der Sauerstoffkonzentration des Gasgemisches und der aktiven Sauerstoff-Konzentration am Kontakt (Abb. 13) und zwischen der  $N_2O$ -Ausbeute und der Sauerstoffkonzentration des Gasgemisches dargestellt.




Abb. 12. (Vgl. Tab. 13.)

NiO: Abhängigkeit der  $N_2O$ -Ausbeute von der im NiO bestimmten aktiven O-Atom-Konzentration.




Abb. 13. (Vgl. Tab. 13.)

NiO: Abhängigkeit der aktiven Sauerstoffkonzentration vom Verhältnis  $NH_3:O_2$  im reagierenden Gasgemisch.




Abb. 14. (Vgl. Tab. 13.)

NiO: Abhängigkeit der  $N_2O$ -Ausbeute vom Verhältnis  $NH_3:O_2$  im reagierenden Gasgemisch.

Das Ergebnis war wie erwartet. Dem höheren Sauerstoffdruck entspricht eine höhere O-Atom-Konzentration und der größeren O-Atom-Konzentration eine vermehrte  $N_2O$ -Ausbeute. Es trat hier trotz des größeren Gehaltes an Sauerstoff keine Bildung von NO ein, so daß man annehmen muß, daß die O-Atom-Konzentration so groß war, daß die Reaktion  $HNO + HNO = N_2O + H_2O$  in den Vordergrund trat, dagegen die Aktivierungswärme der Reaktion  $NH_3O + O_2 = HNO_2 + H_2O$  zu groß ist, daß die Reaktion bei der angewandten Temperatur von  $300^\circ C$  selbst bei wesentlichen  $O_2$ -Überschuß nicht eintritt. Gleichzeitig geht wohl hieraus hervor, daß eine an und für sich mögliche Reaktion  $HNO + O_2 = HNO_3$  ( $\rightarrow NO, NO_2$ ), die ebenfalls Stickoxyde geben würde, nicht stattfindet. Es scheint daher möglich, gerade an diesem Kontakt den Zusammenhang zwischen O-Atom-Konzentration, Sauerstoffgehalt des Gases und den Reaktionen, die zu  $N_2O$  und NO führen, zu untersuchen; dies kann durch Aufnahme von Isothermen, von denen eine hier mitgeteilt ist, bei verschiedenen Temperaturen geschehen.

Diese Untersuchungen sind hier wegen eingetretener äußerer Verhältnisse nicht weiter durchgeführt worden.

Nach diesen Versuchen ist es also wahrscheinlich, daß die  $N_2O$ -Bildung hervorgerufen wird durch die Aktivierung des Sauerstoffs am Oxyd, die, wie wir wissen, in atomarer Form erfolgt. So werden also alle Oxyde, die reversibel O-Atome abspalten, sei es durch Reduktion zum nächst niederen Oxyd oder durch Abgabe der eingebauten O-Atome, zur  $N_2O$ -Bildung führen, wenn nur die Zersetzung des Stickoxyduls bei den entsprechenden Temperaturen noch nicht merklich ist.

Wie bei dem Oxyd des Kobalts wurde auch hier noch die Abhängigkeit der Ausbeuten an Oxydationsprodukten der  $NH_3$ -Verbrennung von der Temperatur untersucht. Als Kontaktmaterial wurde käufliches " $Ni_2O_3$ " und  $NiO \cdot xO$ <sup>1)</sup> verwandt. Die Ergebnisse sind in Abb. 15 wiedergegeben.




Abb. 15. (Vgl. Tab. 14 u. 15.)


1) Es handelte sich hier um ein Produkt, das längere Zeit mit dem Ammoniak-Luft-Gemisch vorbehandelt war, also das Endstadium der Sauerstoffaufnahme erreicht hatte.

Bei beiden beginnt die  $N_2O$ -Bildung bei etwa  $150^\circ$  und endet etwa bei  $470^\circ C$ .  $NO$  bildet sich von  $400^\circ$  an in steigender Menge. Zwischen dem  $NiO \cdot xO$  und dem käuflichen " $Ni_2O_3$ " besteht katalytisch kein wesentlicher Unterschied.

Zur Prüfung dieser Tatsachen wurden noch weitere Oxyde im Hinblick auf die  $N_2O$ -Bildung bei der Ammoniakoxydation untersucht.

### Bariumoxyd - Kontakte

Es wurden die Oxyde des Bariums untersucht. Es ist bekannt, daß das reversible Gleichgewicht  $BaO_2 = BaO + 1/2 O_2$  besteht<sup>1)</sup>. Dabei wird sicher die Zersetzung wie bei  $MnO_2$  zunächst über eine Lockerung der O-Atome gehen. Es müßte sich also auch hier  $N_2O$  bilden können. Die Versuche der Abb. 16 bestätigen das.



Die Reihenfolge der Versuche ist durch Nummern gekennzeichnet.

Abb. 16. (Vgl. Tab. 16.)

Zu den Resultaten muß noch Folgendes bemerkt werden. Das  $BaO_2$  fing bei etwa  $400 - 440^\circ$  an zu sintern und schmolz schließlich zu einer breiigen Masse, die den Kontaktofen verstopfte. Die Versuche konnten daher nicht über  $550^\circ$  hinaus geführt werden. Es zeigte sich nun, daß bei ungefähr  $300^\circ$  das  $NH_3$  sich zu zersetzen begann, während gleichzeitig  $N_2O$  gebildet wurde. Plötzlich, und zwar bei der Temperatur des beginnenden Sinterns, fiel aber die  $N_2O$ -Ausbeute auf einen kleinen Betrag herab, um dann mit steigender Temperatur wieder langsam anzusteigen. Entsprechend ging die  $NH_3$ -Zersetzung zurück und wurde dann wieder stärker. Wurde nun umgekehrt die Reihenfolge der Versuche von höheren zu tieferen Temperaturen ausgeführt, ging die flache Kurve des  $N_2O$  zu Ende, ohne daß das vorher beobachtete Maximum der  $N_2O$ -Ausbeute wieder eintrat. Man kann daraus schließen, daß für das ungesinterte und das gesinterte  $BaO_2$  zwei verschiedene Kurvenzüge gehören, wie es in Abb. 16 auch dargestellt ist. (Die Nummern bedeuten die Reihenfolge der Versuche.)

$NO$  wurde in keinem Falle gefunden, vielleicht weil wir nicht zu höheren Temperaturen gehen konnten. Jedenfalls war hier die O-Atomkonzentration groß genug, um  $N_2O$  zu bilden.

1) J. H. Hildebrand, J. Am. Soc. 34 (1912) 250.

Ferner wurden noch Versuche am  $BaO_2$ -Kontakt mit einem  $NH_3-N_2$ -Gemisch gemacht, um zu sehen, ob die O-Atom-Konzentration am Kontakt auch ohne Luftsauerstoff groß genug ist, um  $N_2O$  zu bilden. Die Versuche wurden in derselben Weise wie bei  $MnO_2$  ausgeführt und sind in Abb. 17 wiedergegeben. Auch hier konnten wir  $N_2O$  erhalten bis zu etwa 60 %.




Abb. 17. (Vgl. Tab. 17.)

Schließlich wurden noch Versuche mit einem  $BaO$ -Kontakt gemacht. Auch hier ergab sich eine - wenn auch geringe -  $N_2O$ -Ausbeute. Das ist verständlich, denn es wird sich hier mit dem Luftsauerstoff des Gasgemisches bedingt durch das Gleichgewicht mit dem höheren Oxyd eine stationäre Sauerstoff-Atom-Konzentration bilden. Abb. 18 zeigt das Ergebnis dieser Versuche.




Abb. 18. (Vgl. Tab. 18.)

Die Versuche an den Bariumoxyd-Kontakten wurden wegen der undefinierten Verhältnisse, die durch das Sintern und die Hydroxydbildung mit dem bei der Reaktion entstandenen Wasser eintreten, nicht weiter fortgesetzt.

# Wismutoxyd - Kontakte

Die Untersuchungen am  $\text{Bi}_2\text{O}_4$ -Kontakt (Abb. 19) ergaben, daß die  $\text{NH}_3$ -Zersetzung bei etwa  $100^\circ\text{C}$  begann und von  $400^\circ$  an NO auftrat. Die NO-Ausbeute stieg ziemlich schnell an und erreichte 80 %, während  $\text{N}_2\text{O}$  nicht gefunden wurde. Ob der plötzliche Wiederanstieg der  $\text{NH}_3$ -Kurve bei  $260^\circ$  auf einem Sinterungseffekt wie beim  $\text{BaO}_2$  beruht, oder aber darauf, daß sich hier das  $\text{Bi}_2\text{O}_4$  in  $\text{Bi}_2\text{O}_3$  umwandelte, was wahrscheinlicher ist, konnte nicht festgestellt werden.




Abb. 19. (Vgl. Tab. 19.)

Bei der thermischen Zersetzung des  $\text{Bi}_2\text{O}_4$ , die bei  $160^\circ$  beginnt, entsteht  $\text{Bi}_2\text{O}_3$  <sup>1)</sup>. Der Vorgang ist irreversibel, es kann sich also weder ein Gleichgewicht zwischen den beiden Oxyden noch eine stationäre O-Atom-Konzentration einstellen. Daher bleibt die  $\text{N}_2\text{O}$ -Bildung aus, und die Reaktion zum NO findet allein statt.

Versuche am  $\text{Bi}_2\text{O}_3$ -Kontakt (Abb. 20) zeigen, daß hier, wie zu erwarten, ebenfalls kein  $\text{N}_2\text{O}$  gebildet wird; von etwa  $500^\circ$  an tritt NO auf.




Abb. 20. (Vgl. Tab. 20.)

1) W. u. O. Worsley, Robertson, J. chem. Soc. 117 (1920) 65.

Nun wurde ein Kontakt vorbereitet, der aus 95 Teilen  $\text{Bi}_2\text{O}_3$  und 5 Teilen KOH bestand. Es zeigte sich, daß hier von etwa  $440^\circ$  an die Ammoniakoxydation zum  $\text{N}_2\text{O}$  geleitet wird (Abb. 21). NO wurde nicht gefunden. Vielleicht konnte das Temperaturgebiet, in dem NO gebildet wird, nicht erreicht werden, da der Kontakt oberhalb  $600^\circ\text{C}$  schmolz.




Abb. 21. (Vgl. Tab. 21.)

Nach älteren Angaben im G m e l i n <sup>1)</sup> sollen sich beim Erhitzen von  $\text{Bi}_2\text{O}_3$  mit KOH an der Luft Peroxyde bilden. Da bei höheren Temperaturen gleichzeitig eine Zersetzung des Peroxydes erfolgt, wird sich auch hier eine stationäre O-Atom-Konzentration einstellen können. Die Bestimmung des aktiven Sauerstoffs ergab, daß nach den Versuchen der Kontakt 4.6 Gew.-% aktiven Sauerstoff enthielt, während vor den Versuchen keiner gefunden wurde. Die Reaktion auf Nitrat und Nitrit im Kontakt verlief negativ.

Aus den Versuchen sieht man also wieder, daß nur dann  $\text{N}_2\text{O}$  auftreten kann, wenn Sauerstoffatome stationär am Kontakt vorhanden sind.

#### Eisenoxyd-Wismutoxyd-Kontakte und Eisenoxyd-Kontakte

In diesem Zusammenhang wurden auch Versuche am Kontakt der I.G. Farbenindustrie gemacht, das ist ein Gemisch von  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  mit etwas  $\text{Bi}_2\text{O}_3$ . M. B o d e n s t e i n und S c h a a f <sup>2)</sup> hatten hier geringe Mengen  $\text{N}_2\text{O}$  gefunden. Auch wir fanden hier zwischen ungefähr  $360^\circ$  und  $500^\circ$  Stickoxydul bis zu 20 %. Abb. 22 zeigt das Ergebnis der Versuche.

In der Abb. 22 sind auch noch Versuche eingetragen, die mit einer doppelt so großen Strömungsgeschwindigkeit des Gasgemisches ausgeführt wurden. (Das Verhältnis  $\text{NH}_3$ : Luft war das gleiche wie bei den andern Versuchen.) Sie zeigen wie bei Untersuchungen von A. v. N a g e l <sup>3)</sup> eine Erweiterung des Temperaturbereiches für die  $\text{N}_2\text{O}$ -Bildung.

1) Gmelins Handbuch d. anorg. Chemie, 8. Aufl. Bi, S. 114.

2) M. Bodenstein, Z. Elektroch. 36 (1930) 756. Diskussionsbemerkung.

3) A. v. Nagel, Z. Elektroch. 36 (1930) 754.




Abb. 22. (Vgl. Tab. 22 u. 23.)

Schließlich führten die Versuche am reinen  $Fe_2O_3$ -Kontakt zu dem gleichen Ergebnis wie bei dem der I.G. Farbenindustrie, nur waren hier die  $N_2O$ -Ausbeuten zu etwas höheren Temperaturen verschoben (Abb. 23).





Abb. 23. (Vgl. Tab. 24.)

### Zusammenfassung

Die hier mitgeteilten Versuche hatten folgendes Ergebnis:

1. Die  $N_2O$ -Bildung ist abhängig von der aktiven (atomaren) Sauerstoffkonzentration, wie vor allem die Versuche mit  $NiO$  zeigen, und ist nicht an besonders tiefe Temperaturen geknüpft, wie A.v. Nagel vermutete, höchstens insofern, als das gebildete  $N_2O$  bei höheren Temperaturen wieder zerfällt.
2. Die Bildung von  $NO$  geht nicht über  $HNO$ , sondern über die Reaktion  $NH_3O + O_2$ . Für sie ist eine große O-Atom-Konzentration nicht Bedingung, sondern ein möglichst großer Gehalt des Gases an  $O_2$ .
3. Durch geeignete Zusätze (Alkali) kann in Übereinstimmung mit K. A. Hofmann die  $NO$ -Bildung zu tieferer Temperatur verschoben werden, entsprechend der Tatsache, daß die Reaktion  $NH_3O + O_2 = HNO_2 + H_2O$  in Gegenwart von Alkali leicht vor sich geht.

4. Es läßt sich daher schließen, daß die Reaktionsfolge an oxydischen Kontakten die gleiche ist wie an Platin bei kleinen Drucken:



5. An Kontakten mit nur geringer O-Atom-Konzentration, bei denen die Lebensdauer des  $\text{HN}_3\text{O}$  genügend groß ist, kann die NO-Bildung schon bei tiefer Temperatur auftreten.

### Tabellen

der in der Arbeit ausgeführten Versuche. Die Spalten der Tabellen bedeuten:

- Spalte 1. Die Versuchstemperatur in  $^{\circ}\text{C}$  = Temp.  
 " 2. Die Versuchsdauer in Minuten = Zeit  
 " 3. Das während des Versuches durchgeschickte  $\text{NH}_3$  in Mikromolen =  $\text{NH}_{3\text{D}}$   
 " 4. Das wiedergefundene  $\text{NH}_3$  in Mikromolen =  $\text{NH}_{3\text{G}}$   
 " 5. Das gefundene  $\text{N}_2\text{O}$  in Mikromolen =  $\text{N}_{2\text{O G}}$   
 " 6. Das gefundene NO in Mikromolen =  $\text{NO}_\text{G}$   
 " 7. Das wiedergefundene  $\text{NH}_3$ , bezogen auf 100 durchgeschicktes  $\text{NH}_3$  =  $\% \text{NH}_{3\text{G}}$   
 " 8. Das gefundene  $\text{N}_2\text{O}$ , bezogen auf 100 durchgeschicktes  $\text{NH}_3$  =  $\% \text{N}_{2\text{O G}}$   
 " 9. Das gefundene NO, bezogen auf 100 durchgeschicktes  $\text{NH}_3$  =  $\% \text{NO}_\text{G}$

Für die anders gearteten Tabellen ist die Bedeutung der Spalten in entsprechender Weise jeweils angegeben.

Tab. 1 (zu Abb. 2)

$\text{NH}_3$ -Oxydation an Pyrolusit (gekörrnt)

| Temp. | Zeit | $\text{NH}_{3\text{D}}$ | $\text{NH}_{3\text{G}}$ | $\text{N}_{2\text{O G}}$ | $\text{NO}_\text{G}$ | $\% \text{NH}_{3\text{G}}$ | $\% \text{N}_{2\text{O G}}$ | $\% \text{NO}_\text{G}$ |
|-------|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 138   | 5.0  | 3300                    | 2620                    | 0                        | 0                    | 80                         | 0                           | 0                       |
| 232   | 5.0  | 3640                    | 555                     | 709                      | 0                    | 15                         | 39                          | 0                       |
| 290   | 5.0  | 3640                    | 0                       | 1140                     | 0                    | 0                          | 63                          | 0                       |
| 370   | 5.0  | 3640                    | 0                       | 1220                     | 0                    | 0                          | 67                          | 0                       |
| 427   | 5.0  | 3350                    | 0                       | 1120                     | Spur                 | 0                          | 64                          | Spur                    |
| 535   | 5.0  | 3510                    | 0                       | 399                      | 210                  | 0                          | 23                          | 6                       |

| Temp. | Zeit | NH <sub>3</sub> D | NH <sub>3</sub> G | N <sub>2</sub> O <sub>G</sub> | NO <sub>G</sub> | % NH <sub>3</sub> G | % N <sub>2</sub> O <sub>G</sub> | % NO <sub>G</sub> |
|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|

Tab. 2 (zu Abb. 2)

NH<sub>3</sub>-Oxydation an Pyrolusit (gepulvert und gepreßt)

|     |     |      |     |      |      |    |    |      |
|-----|-----|------|-----|------|------|----|----|------|
| 270 | 5.3 | 3690 | 383 | 565  | 0    | 10 | 31 | 0    |
| 275 | 5.0 | 3370 | 0   | 795  | 0    | 0  | 47 | 0    |
| 340 | 5.0 | 3910 | 0   | 1470 | 0    | 0  | 75 | 0    |
| 480 | 5.0 | 3760 | 0   | 754  | Spur | 0  | 40 | Spur |

Tab. 3 (zu Abb. 3)

NH<sub>3</sub>-Oxydation am MnO<sub>2</sub> (gefällt)

|     |     |      |     |      |     |    |    |    |
|-----|-----|------|-----|------|-----|----|----|----|
| 205 | 5.0 | 3290 | 260 | 890  | 0   | 10 | 54 | 0  |
| 235 | 5.0 | 3430 | 0   | 1100 | 0   | 0  | 72 | 0  |
| 250 | 5.0 | 3500 | 0   | 1220 | 0   | 0  | 64 | 0  |
| 275 | 5.0 | 3400 | 0   | 1230 | 0   | 0  | 70 | 0  |
| 315 | 6.0 | 3680 | 0   | 1310 | 0   | 0  | 71 | 0  |
| 380 | 5.0 | 3880 | 0   | 1000 | 128 | 0  | 52 | 3  |
| 435 | 5.0 | 3800 | 0   | 570  | 28  | 0  | 30 | 1  |
| 445 | 5.0 | 3480 | 0   | 360  | 426 | 0  | 21 | 12 |

Tab. 4 (zu Abb. 3)

NH<sub>3</sub>-Oxydation an MnO<sub>2</sub> (gefällt) mit Alkali (MnO<sub>2</sub> : KOH = 15 : 2.3)

|     |     |      |     |      |      |    |      |    |
|-----|-----|------|-----|------|------|----|------|----|
| 220 | 5   | 3620 | 371 | 901  | 0    | 10 | 50   | 0  |
| 270 | 5   | 3820 | 170 | 1190 | 0    | 11 | 62   | 0  |
| 300 | 5.5 | 3890 | 0   | 1130 | 265  | 0  | 58   | 7  |
| 305 | 5   | 3480 | 0   | 1030 | 230  | 0  | 59   | 7  |
| 355 | 5   | 3580 | 0   | 910  | 590  | 0  | 51   | 17 |
| 385 | 5   | 3410 | 0   | 537  | 1000 | 0  | 51   | 29 |
| 460 | 5   | 3880 | 0   | Spur | 1687 | 0  | Spur | 44 |

Tab. 5 (zu Abb. 4)

NH<sub>3</sub>-Oxydation an Pyrolusit (gepulvert) mit Alkali (Py : KOH = 45 : 7.7)

|     |   |      |      |      |      |     |    |    |
|-----|---|------|------|------|------|-----|----|----|
| 130 | 5 | 3560 | 3550 | 0    | 0    | 100 | 0  | 0  |
| 195 | 5 | 4000 | 3610 | 0    | 0    | 89  | 0  | 0  |
| 208 | 5 | 3900 | 3230 | 0    | 0    | 83  | 0  | 0  |
| 270 | 5 | 3490 | 1130 | 172  | 0    | 33  | 10 | 0  |
| 285 | 5 | 3900 | 2220 | 357  | 0    | 52  | 18 | 0  |
| 330 | 5 | 3600 | 52   | 1060 | 0    | 2   | 59 | 0  |
| 375 | 5 | 3930 | 0    | 612  | 0    | 0   | 31 | 0  |
| 408 | 5 | 3900 | 0    | 758  | 600  | 0   | 39 | 15 |
| 423 | 4 | 2560 | 0    | ---  | 765  | 0   | -- | 30 |
| 565 | 5 | 3930 | 0    | 0    | 1500 | 0   | 0  | 38 |

Tab. 6 (zu Abb. 5)

N<sub>2</sub>O-Zerfall am Pyrolusit (gekörnt)

| Temp. | Zeit | N <sub>2</sub> O <sub>D</sub> | N <sub>2</sub> O <sub>G</sub> | % N <sub>2</sub> O <sub>G</sub> |
|-------|------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|-------|------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|

|     |   |      |     |    |
|-----|---|------|-----|----|
| 485 | 4 | 1130 | 620 | 55 |
| 525 | 6 | 1480 | 280 | 19 |

N<sub>2</sub>O-Zerfall an Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (gefällt)

|     |   |      |      |     |
|-----|---|------|------|-----|
| 420 | 5 | 1980 | 1990 | 100 |
| 480 | 5 | 1980 | 1640 | 83  |
| 530 | 5 | 2150 | 320  | 15  |
| 535 | 5 | 2070 | 367  | 18  |

| Temp. | Zeit | NH <sub>3D</sub> | NH <sub>3G</sub> | N <sub>2</sub> O <sub>G</sub> | NO <sub>G</sub> | % NH <sub>3G</sub> | % N <sub>2</sub> O <sub>G</sub> | % NO <sub>G</sub> |
|-------|------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|
|-------|------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|

Tab. 7 (zu Abb. 6)

| NH <sub>3</sub> -Oxydation an Mn <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (gefällt) |   |      |     |      |      |    |    |      |
|------------------------------------------------------------------------|---|------|-----|------|------|----|----|------|
| 275                                                                    | 5 | 3200 | 600 | 730  | 0    | 19 | 46 | 0    |
| 330                                                                    | 5 | 3410 | 0   | 1090 | Spur | 0  | 64 | Spur |
| 400                                                                    | 5 | 3220 | 0   | 890  | 570  | 0  | 56 | 18   |
| 435                                                                    | 5 | 3310 | 0   | 690  | 1273 | 0  | 42 | 38   |

Tab. 8 (zu Abb. 7)

| NH <sub>3</sub> -N <sub>2</sub> -Gemisch über Pyrolusit (gekörnt) |     |      |     |      |      |    |    |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|------|------|----|----|------|
| 210                                                               | 3.0 | 2210 | 808 | 57   | 0    | 37 | 4  | 0    |
| 275                                                               | 4.0 | 2910 | 0   | 388  | 0    | 0  | 26 | 0    |
| 280                                                               | 6.0 | 4810 | 291 | 840  | 0    | 6  | 35 | 0    |
| 305                                                               | 6.0 | 3920 | 0   | 1360 | 0    | 0  | 69 | 0 1) |
| 355                                                               | 4.0 | 3040 | 0   | 792  | 0    | 0  | 52 | 0    |
| 385                                                               | 6.0 | 4470 | 0   | 146  | 0    | 0  | 66 | 0 1) |
| 450                                                               | 4.0 | 2970 | 0   | 688  | 0    | 0  | 43 | 0    |
| 510                                                               | 4.0 | 2610 | 0   | 126  | Spur | 0  | 14 | Spur |

1) Diese Versuche wurden mit NH<sub>3</sub>-Luft-Gemisch gemacht.

Tab. 9 (zu Abb. 9)

| (Nr.) | NH <sub>3</sub> -Oxydation an MnO bei konstanter Temperatur |     |      |     |      |   |   |    |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----|------|---|---|----|
| 1     | 360                                                         | 5.0 | 3830 | 245 | 79   | 0 | 6 | 4  |
| 2     | 360                                                         | 5.0 | 3940 | 246 | 399  | 0 | 6 | 20 |
| 3     | 360                                                         | 5.0 | 3880 | 0   | 876  | 0 | 0 | 45 |
| 4     | 360                                                         | 5.0 | 3800 | 0   | 1052 | 0 | 0 | 56 |
| 5     | 360                                                         | 5.0 | 3880 | 0   | 1150 | 0 | 0 | 59 |

Tab. 10 (zu Abb. 9a)

| NH <sub>3</sub> -Oxydation an MnO.xO |     |      |      |      |      |    |      |    |
|--------------------------------------|-----|------|------|------|------|----|------|----|
| 235                                  | 5,0 | 3630 | 1450 | 649  | 0    | 40 | 36   | 0  |
| 310                                  | 5,0 | 3700 | 0    | 1420 | 0    | 0  | 71   | 0  |
| 380                                  | 5,0 | 3670 | 0    | 1160 | 348  | 0  | 65   | 10 |
| 420                                  | 5,0 | 3670 | 0    | 800  | 313  | 0  | 44   | 9  |
| 470                                  | 5,0 | 3610 | 0    | 704  | 230  | 0  | 41   | 6  |
| 530                                  | 5,0 | 4080 | 0    | Spur | 1200 | 0  | Spur | 30 |

Tab. 11 (zu Abb. 10)

NH<sub>3</sub>-Oxydation an CoO bei konstanter Temperatur

In Spalte 1 ist die Zeit in Minuten angegeben, die das Gasgemisch bei Beginn des Versuchs überhaupt über den Kontakt geströmt ist.

| Ges. Zeit | Temp. | Zeit | NH <sub>3D</sub> | NH <sub>3G</sub> | N <sub>2</sub> O <sub>G</sub> | NO <sub>G</sub> | % NH <sub>3G</sub> | % N <sub>2</sub> O <sub>G</sub> | % NO <sub>G</sub> |
|-----------|-------|------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| 20        | 330   | 5,0  | 3580             | 0                | 174                           | 0               | 0                  | 10                              | 0                 |
| 48        | 330   | 5,0  | 3680             | 0                | 289                           | Spur            | 0                  | 16                              | Spur              |
| 80        | 330   | 5,0  | 3800             | 0                | 794                           | 115             | 0                  | 42                              | 3                 |
| 107       | 330   | 5,0  | 3280             | 0                | 760                           | 280             | 0                  | 46                              | 9                 |

| Temp. | Zeit | NH <sub>3D</sub> | NH <sub>3G</sub> | N <sub>2</sub> O <sub>G</sub> | NO <sub>G</sub> | % NH <sub>3G</sub> | % N <sub>2</sub> O <sub>G</sub> | % NO <sub>G</sub> |
|-------|------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|
|-------|------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|

Tab. 12 (zu Abb. 11)

NH<sub>3</sub>-Oxydation an "Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub>"

|     |     |      |      |      |      |    |    |    |
|-----|-----|------|------|------|------|----|----|----|
| 185 | 5,1 | 3790 | 1410 | 348  | 0    | 37 | 18 | 0  |
| 232 | 5,0 | 3770 | 0    | 1010 | 0    | 0  | 54 | 0  |
| 255 | 5,0 | 3680 | 0    | 1140 | 40   | 0  | 62 | 1  |
| 280 | 5,0 | 3600 | 0    | 1110 | 93   | 0  | 59 | 3  |
| 305 | 5,0 | 3940 | 0    | 1130 | 245  | 0  | 57 | 6  |
| 330 | 8,2 | 6415 | 0    | 1320 | 470  | 0  | 41 | 7  |
| 370 | 5,0 | 4050 | 0    | 852  | 460  | 0  | 42 | 11 |
| 415 | 5,0 | 4050 | 0    | 313  | 1160 | 0  | 16 | 29 |

Tab. 13 (zu Abb. 12 bis 14)

NH<sub>3</sub>-Oxydation an NiO mit NH<sub>3</sub>-Luft-O<sub>2</sub>-Gemischen

In Spalte 1 ist das Verhältnis NH<sub>3</sub>: O<sub>2</sub> im Gasgemisch angegeben.

| NH <sub>3</sub> : O <sub>2</sub> | Temp. | Zeit | NH <sub>3D</sub> | N <sub>2</sub> O <sub>G</sub> | % N <sub>2</sub> O <sub>G</sub> | Akt. Sauerst. <sup>1)</sup> |
|----------------------------------|-------|------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 : 1,0                          | 300   | 5,0  | 3500             | 322                           | 18                              | 0,21                        |
| 1 : 2,1                          | 300   | 5,0  | 3350             | 1030                          | 60                              | 0,63                        |
| 1 : 2,6                          | 300   | 6,0  | 4010             | 1470                          | 73                              | 0,76                        |
| 1 : 2,9                          | 300   | 5,0  | 3450             | 1370                          | 68                              | 0,85                        |
| 1 : 1,0                          | 300   | 5,0  | 3400             | 431                           | 25                              | 0,29                        |

1) Der im Kontakt bestimmte aktive Sauerstoff, angegeben in O-Atomen für eine Molekel NiO.

Tab. 14 (zu Abb. 15)

NH<sub>3</sub>-Oxydation an NiO · xO

| Temp. | Zeit | NH <sub>3D</sub> | NH <sub>3G</sub> | N <sub>2</sub> O <sub>G</sub> | NO <sub>G</sub> | % NH <sub>3G</sub> | % N <sub>2</sub> O <sub>G</sub> | % NO <sub>G</sub> |
|-------|------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| 135   | 5,1  | 3860             | 3740             | 0                             | 0               | 97                 | 0                               | 0                 |
| 192   | 5,0  | 3880             | 2310             | 394                           | 0               | 60                 | 26                              | 0                 |
| 275   | 5,0  | 3550             | 0                | 550                           | 0               | 0                  | 31                              | 0                 |
| 315   | 5,0  | 4100             | 0                | 540                           | 0               | 0                  | 26                              | 0                 |
| 360   | 5,0  | 3930             | 0                | 585                           | 0               | 0                  | 30                              | 0                 |
| 410   | 5,0  | 4100             | 0                | 573                           | 150             | 0                  | 28                              | 4                 |
| 487   | 5,0  | 4050             | 0                | 0                             | 585             | 0                  | 0                               | 14                |

Tab. 15 (zu Abb. 15)

NH<sub>3</sub>-Oxydation an "Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub>"

|     |     |      |      |     |      |    |    |      |
|-----|-----|------|------|-----|------|----|----|------|
| 160 | 5,0 | 3700 | 2620 | 47  | 0    | 71 | 3  | 0    |
| 205 | 5,0 | 3350 | 1790 | 168 | 0    | 54 | 10 | 0    |
| 270 | 5,0 | 3430 | 339  | 486 | 0    | 10 | 28 | 0    |
| 315 | 5,0 | 3430 | 0    | 488 | 0    | 0  | 29 | 0    |
| 380 | 5,0 | 3500 | 0    | 317 | 0    | 0  | 20 | 0    |
| 440 | 5,0 | 3930 | 0    | 130 | Spur | 0  | 7  | Spur |
| 525 | 5,0 | 3800 | 0    | 0   | 465  | 0  | 00 | 12   |

| Nr. | Temp. | Zeit | NH <sub>3</sub> D | NH <sub>3</sub> G | N <sub>2</sub> O <sub>G</sub> | NO <sub>G</sub> | % NH <sub>3</sub> G | % N <sub>2</sub> O <sub>G</sub> | % NO <sub>G</sub> |
|-----|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
|-----|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|

Tab. 16 (zu Abb. 16)

NH<sub>3</sub>-Oxydation an BaO<sub>2</sub>

|   |     |     |      |      |      |   |     |    |   |
|---|-----|-----|------|------|------|---|-----|----|---|
| 1 | 260 | 5.0 | 3530 | 3530 | 0    | 0 | 100 | 0  | 0 |
| 2 | 310 | 5.0 | 3530 | 3520 | 0    | 0 | 100 | 0  | 0 |
| 3 | 367 | 5.0 | 3290 | 1920 | 629  | 0 | 58  | 38 | 0 |
| 4 | 440 | 5.0 | 3240 | 184  | 1105 | 0 | 6   | 68 | 0 |
| 5 | 488 | 5.0 | 3100 | 1770 | 327  | 0 | 57  | 21 | 0 |
| 6 | 407 | 5.0 | 3566 | 3420 | 64   | 0 | 96  | 4  | 0 |
| 7 | 552 | 5.0 | 3040 | 902  | 374  | 0 | 30  | 25 | 0 |

Tab. 17 (zu Abb. 17)

NH<sub>3</sub>-N<sub>2</sub>-Gemisch über BaO<sub>2</sub>

|   |     |     |      |      |      |   |    |    |   |
|---|-----|-----|------|------|------|---|----|----|---|
| 1 | 290 | 5.0 | 3680 | 3510 | 0    | 0 | 98 | 0  | 0 |
| 2 | 340 | 5.0 | 4100 | 3710 | 157  | 0 | 91 | 8  | 0 |
| 3 | 395 | 5.0 | 3390 | 252  | 1030 | 0 | 7  | 61 | 0 |
| 4 | 385 | 5.0 | 375  | 258  | 33   | 0 | 93 | 2  | 0 |

Tab. 18 (zu Abb. 18)

NH<sub>3</sub>-Oxydation an BaO

|     |     |      |      |     |   |    |    |   |
|-----|-----|------|------|-----|---|----|----|---|
| 265 | 5.3 | 3630 | 3440 | 0   | 0 | 95 | 0  | 0 |
| 300 | 5.0 | 3280 | 3120 | 0   | 0 | 95 | 0  | 0 |
| 373 | 5.0 | 3450 | 1230 | 172 | 0 | 36 | 10 | 0 |
| 390 | 5.0 | 3600 | 1390 | 498 | 0 | 39 | 17 | 0 |
| 400 | 5.0 | 3930 | 1130 | 136 | 0 | 29 | 7  | 0 |

Tab. 19 (zu Abb. 19)

NH<sub>3</sub>-Oxydation an Bi<sub>2</sub>O<sub>4</sub>

|     |     |      |      |   |      |    |   |      |
|-----|-----|------|------|---|------|----|---|------|
| 197 | 5.0 | 3500 | 2560 | 0 | 0    | 73 | 0 | 0    |
| 250 | 5.0 | 3350 | 1820 | 0 | 0    | 54 | 0 | 0    |
| 292 | 5.0 | 3280 | 2240 | 0 | 0    | 68 | 0 | 0    |
| 338 | 5.0 | 3410 | 2170 | 0 | 0    | 64 | 0 | 0    |
| 425 | 5.0 | 3570 | 353  | 0 | Spur | 10 | 0 | Spur |
| 525 | 5.0 | 3900 | 0    | 0 | 2550 | 0  | 0 | 65   |

Tab. 20 (zu Abb. 20)

NH<sub>3</sub>-Oxydation an Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

|     |     |      |      |   |      |      |   |      |
|-----|-----|------|------|---|------|------|---|------|
| 260 | 5.0 | 4100 | 3760 | 0 | 0    | 92   | 0 | 0    |
| 300 | 5.0 | 3500 | 3210 | 0 | 0    | 92   | 0 | 0    |
| 352 | 5.0 | 3550 | 3120 | 0 | 0    | 88   | 0 | 0    |
| 420 | 5.0 | 3600 | 2620 | 0 | 0    | 73   | 0 | 0    |
| 455 | 5.0 | 4380 | 2630 | 0 | 0    | 60   | 0 | 0    |
| 515 | 5.0 | 3680 | Spur | 0 | Spur | Spur | 0 | Spur |
| 587 | 5.0 | 4100 | 0    | 0 | 270  | 0    | 0 | 6    |

| - 30 - |      |                  |                  |                               |                 |                    |                                 |                   |
|--------|------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| Temp.  | Zeit | NH <sub>3D</sub> | NH <sub>3G</sub> | N <sub>2</sub> O <sub>G</sub> | NO <sub>G</sub> | % NH <sub>3G</sub> | % N <sub>2</sub> O <sub>G</sub> | % NO <sub>G</sub> |

Tab. 21 (zu Abb. 21)

NH<sub>3</sub>-Oxydation an Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit Alkali (Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: KOH = 95 : 5)

|     |     |      |      |     |   |    |    |   |
|-----|-----|------|------|-----|---|----|----|---|
| 410 | 5.0 | 3220 | 2620 | 0   | 0 | 82 | 0  | 0 |
| 445 | 5.0 | 3450 | 2770 | 36  | 0 | 81 | 2  | 0 |
| 445 | 5.0 | 3620 | 2670 | 110 | 0 | 74 | 6  | 0 |
| 518 | 5.0 | 3480 | 323  | 220 | 0 | 9  | 13 | 0 |
| 570 | 5.0 | 3620 | 0    | 797 | 0 | 0  | 44 | 0 |
| 570 | 5.0 | 3470 | 0    | 542 | 0 | 0  | 31 | 0 |
| 593 | 5.0 | 3680 | 0    | 740 | 0 | 0  | 40 | 0 |

Tab. 22 (zu Abb. 22)

NH<sub>3</sub>-Oxydation am Kontakt der I.G.-Farben (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)

|     |     |      |      |      |      |    |      |    |
|-----|-----|------|------|------|------|----|------|----|
| 115 | 5.0 | 3250 | 3210 | 0    | 0    | 99 | 0    | 0  |
| 245 | 5.0 | 4050 | 2430 | 0    | 0    | 60 | 0    | 0  |
| 308 | 5.0 | 3650 | 1900 | 0    | 0    | 52 | 0    | 0  |
| 395 | 5.0 | 3580 | Spur | 220  | 0    | 12 | Spur | 0  |
| 415 | 5.0 | 3350 | 0    | 330  | 90   | 0  | 20   | 3  |
| 460 | 5.0 | 3550 | 0    | 144  | 300  | 0  | 8    | 9  |
| 495 | 5.0 | 4050 | 0    | Spur | ---  | 0  | Spur | -  |
| 545 | 5.0 | 3870 | 0    | 0    | 1090 | 0  | 0    | 28 |

Tab. 23 (zu Abb. 22)

NH<sub>3</sub>-Oxydation am Kontakt der I.G.-Farben mit doppelter Strömungsgeschwindigkeit (ca. 1540 · 10<sup>-6</sup> Mole NH<sub>3</sub> pro Min.)

|     |     |      |      |     |     |    |    |    |
|-----|-----|------|------|-----|-----|----|----|----|
| 375 | 3.0 | 4580 | 1830 | 275 | 0   | 40 | 12 | 0  |
| 440 | 3.1 | 4620 | 145  | 414 | 0   | 3  | 18 | 0  |
| 480 | 3.0 | 4760 | 0    | 340 | 670 | 0  | 14 | 14 |
| 502 | 3.0 | 4500 | 0    | 180 | 640 | 0  | 8  | 15 |

Tab. 24 (zu Abb. 23)

NH<sub>3</sub>-Oxydation an Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

|     |     |      |      |     |     |    |    |    |
|-----|-----|------|------|-----|-----|----|----|----|
| 315 | 5.0 | 3430 | 2730 | 0   | 0   | 80 | 0  | 0  |
| 420 | 5.0 | 3430 | 1160 | 59  | 0   | 34 | 3  | 0  |
| 450 | 5.0 | 3550 | 664  | 195 | 0   | 19 | 11 | 0  |
| 460 | 5.0 | 3550 | 342  | 228 | 0   | 10 | 13 | 0  |
| 490 | 5.0 | 3550 | 184  | 213 | 0   | 5  | 12 | 0  |
| 512 | 5.0 | 3750 | 0    | 221 | 230 | 0  | 12 | 6  |
| 545 | 5.0 | 3800 | 0    | 179 | 370 | 0  | 9  | 10 |

Vorliegende Arbeit wurde in der Zeit vom Juni 1937 bis zum August 1939 im Physikalischen-chemischen Institut der Universität Berlin durchgeführt.

Herrn Dozenten Dr. habil. W. K r a u s s danke ich herzlich für die Anregung und Förderung der Arbeit, ebenso Herrn Prof. Dr. P. G ü n t h e r für die freundliche Bereitstellung der Institutsmittel.

## Lebenslauf

Mein Vater ist der Kunstmaler Gustav Neuhaus, meine Mutter die verstorbene Luise, geb. Miether. Ich, Adalbert Neuhaus, wurde am 10. März 1913 in Görlitz als zweiter Sohn geboren. Mein Bekenntnis ist evangelisch. Ich bin deutscher Staatsangehörigkeit und arischer Abstammung. Ich besuchte die folgenden Schulen: Von 1919 bis 1923 die Bürgerschule zu Niederlößnitz bei Dresden, von 1923 bis 1926 das Realgymnasium in Radebeul und von 1926 bis 1932 das Reform-Realgymnasium der Kirschner-Schule in Berlin, wo ich Ostern 1932 das Reifezeugnis erhielt. Ostern 1932 wurde ich an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin immatrikuliert, um Chemie zu studieren. Am 27. Mai 1935 bestand ich das erste und am 29. Juni 1937 das zweite Verbandsexamen. Seit dieser Zeit bin ich mit der Ausführung meiner Doktorarbeit im Physikalisch-chemischen Institut der Universität Berlin beschäftigt.



